

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О проведении иммунизации второй бустерной профилактической прививкой против коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, для всех групп населения, кроме лиц с тяжёлым иммунодефицитом в возрасте старше 18 лет

Зарегистрирован Министерством юстиции
Приднестровской Молдавской Республики 28 сентября 2022 г.
Регистрационный № 11285

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 28 февраля 2007 года № 180-3-IV «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (САЗ 07-10), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 2017 года № 60 «Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной численности Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-15) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 14 июня 2017 года № 148 (САЗ 17-25), от 7 декабря 2017 года № 334 (САЗ 17-50), от 17 октября 2018 года № 352 (САЗ 18-42), от 14 декабря 2018 года № 448 (САЗ 18-51), от 26 апреля 2019 года № 143 (САЗ 19-17), от 8 августа 2019 года № 291 (САЗ 19-30), от 29 сентября 2020 года № 330 (САЗ 20-40), от 22 октября 2020 года № 364 (САЗ 20-43), от 15 ноября 2019 года № 400 (САЗ 19-44), от 8 декабря 2020 года № 433 (САЗ 20-50), от 25 января 2021 года № 19 (САЗ 21-4), от 20 января 2022 года № 11 (САЗ 22-2), в целях профилактики заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванной новым типом вируса COVID-19, и поддержания процесса иммунизации против коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, для достижения снижения заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, приказываю:

1. Провести в лечебно-профилактических учреждениях государственной системы здравоохранения иммунизацию второй бустерной профилактической прививкой против коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19 (далее - COVID-19), для всех групп населения, кроме лиц с тяжёлым иммунодефицитом в возрасте старше 18 лет в порядке, предусмотренном настоящим Приказом.

2. Установить, что для достижения снижения заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, иммунизации второй бустерной профилактической прививкой против COVID-19 подлежат следующие группы населения:

а) лица с повышенным риском тяжёлых клинических форм COVID-19 (Приложение № 1 к настоящему Приказу);

б) лица с профессиональным риском заражения и профессиональным риском передачи COVID-19 (Приложение № 2 к настоящему Приказу);

в) лица с тяжёлыми иммунодепрессивными состояниями в возрасте старше 18 лет (Приложение № 3 к настоящему Приказу).

Иммунизация второй бустерной профилактической прививкой против COVID-19 групп населения:

а) предусмотренных подпунктами а) и б) части первой настоящего пункта, проводится в соответствии со схемой, предусмотренной Приложением № 4 к настоящему Приказу;

б) предусмотренной подпунктом в) части первой настоящего пункта, проводится в соответствии со схемой, предусмотренной Приложением № 5 к настоящему Приказу.

3. Руководителям лечебно-профилактических учреждений государственной системы здравоохранения:

а) обеспечить ведение учета и отчетности сведений иммунизации второй бустерной профилактической прививкой против COVID-19 в автоматизированной информационной системе «Электронный регистр вакцинации против COVID-19»;

б) проводить мониторинг за побочными проявлениями после иммунизации (далее - ПППИ) с составлением формы сообщения о ПППИ и ее направлением в территориальные центры гигиены и эпидемиологии в порядке, предусмотренном правовым актом Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики.

4. Главным врачам государственного учреждения «Республиканский центр гигиены и эпидемиологии» и территориальных центров гигиены и эпидемиологии обеспечить лечебно-профилактические учреждения государственной системы здравоохранения вакцинами против COVID-19 и средствами для иммунизации, необходимыми для проведения иммунизации второй бустерной профилактической прививкой против COVID-19.

5. Ответственность за проведение иммунизации второй бустерной профилактической прививкой против COVID-19, за планирование, получение и управление запасами профилактических прививок против COVID-19, введение запланированных профилактических прививок против COVID-19, мониторинг ПППИ, учет и отчетность сведений об иммунизации второй бустерной профилактической прививкой против COVID-19 возложить на главных врачей лечебно-профилактических учреждений государственной системы здравоохранения.

6. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

7. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики.

8. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Министр

К. АЛБУЛ

г. Тирасполь
23 августа 2022 г.
№ 729

Приложение № 1 к Приказу
Министерства здравоохранения
Приднестровской Молдавской Республики
от 23 августа 2022 года № 729

Перечень лиц с повышенным риском тяжёлых клинических форм COVID-19

- а) лица старше 60 лет;
- б) лица с сопутствующими заболеваниями (в возрасте старше 18 лет);
- в) беременные и кормящие грудью женщины;
- г) лица, опекаемые в домах и школах интернатах, а также в центрах временного или долгосрочного размещения (в возрасте старше 18 лет).

Приложение № 2 к Приказу
Министерства здравоохранения
Приднестровской Молдавской Республики
от 23 августа 2022 года № 729

Перечень лиц с профессиональным риском заражения и профессиональным риском передачи COVID-19 (в возрасте старше 18 лет)

- а) персонал лечебно-профилактических и санитарно-профилактических организаций всех организационно-правовых форм;

б) персонал организаций всех организационно-правовых форм с повышенным профессиональным риском передачи инфекции COVID-19:

1) персонал детских домов, домов-интернатов, школ-интернатов, а также мест пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства в Приднестровской Молдавской Республике (в возрасте старше 18 лет);

2) социальные работники;

3) работники организаций образования;

4) работники и служащие Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики, Министерства обороны Приднестровской Молдавской Республики, Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики и Министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики.

Приложение № 3 к Приказу
Министерства здравоохранения
Приднестровской Молдавской Республики
от 23 августа 2022 года № 729

Перечень лиц с тяжёлыми иммунодепрессивными состояниями

1. Онкологические пациенты (злокачественные новообразования и гематологические онкозаболевания), находящиеся на активном лечении (химиотерапия, лучевая терапия, молекулярная (биологическая) терапия и другие биологические препараты, которые классифицируются как иммунодепрессанты или иммуномодуляторы).

2. Онкологические пациенты, находящихся на поздних стадиях развития болезни, получающие или не получающие раннее активное лечение (лучевая терапия, химиотерапия, молекулярная терапия, иммунодепрессантная терапия).

3. Пациенты после трансплантации органов, получающие или не получающие иммунодепрессантное лечение.

4. Пациенты с трансплантацией кроветворных стволовых клеток, получающие или не получающие иммунодепрессантное лечение.

5. Пациенты с тяжёлым иммунодефицитом, вызванные первичным иммунодефицитом, врожденные (например: синдром DiGeorge, синдром Wiskott-Aldrich и другие) и приобретенные соответственно.

6. Пациенты с ВИЧ-инфекцией на любой стадии, не получающие лечение или в стадии СПИДа, (CD4 <200 ммк), с или без антиретровирусного лечения.

7. Пациенты со вторичным иммунодефицитом, вызванным лечением иммунодепрессантами: лучевая терапия; химиотерапия (химиотерапевтические средства от рака классифицируются как тяжелые иммунодепрессанты).

8. Пациенты, получающие биологическую терапию (молекулярную, клеточную): с моноклональными антителами, биспецифическими антителами, CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T), блокаторы TNF и другие.

9. Пациенты, проходящие курс лечения кортизоном и его производными: активное лечение высокими дозами (> 20 мг преднизолона или его эквивалента в день продолжительностью более 2 недель).

10. Пациенты, получающие другие виды лечения с иммунодепрессивным действием.

Приложение № 4 к Приказу
Министерства здравоохранения
Приднестровской Молдавской Республики
от 23 августа 2022 года № 729

Схема иммунизации второй бустерной профилактической прививкой против COVID-19 для всех групп населения, кроме лиц с тяжёлым иммунодефицитом в возрасте старше 18 лет

Название вакцины	1-ая бустерная доза профилактической прививки против COVID-19	2-ая бустерная доза профилактической прививки против COVID-19 вводится через 4 месяца после 1-ой бустерной дозы профилактической прививкой против COVID-19
Comirnaty Pfizer/BioNTech	Comimaty Pfizer/BioNTech (0,3 мл) или Modema/Spikevax (0,25мл)	Comimaty Pfizer/BioNTech (0,3 мл) или Modema/Spikevax (0,25мл)
Moderna (Spikevax)	Comimaty Pfizer/BioNTech (0,3 мл) или Modema/Spikevax (0,25мл)	Comimaty Pfizer/BioNTech (0,3 мл) или Modema/Spikevax (0,25мл)
Vaxzevria (Astra Zeneca)	Comimaty Pfizer/BioNTech (0,3 мл) или Modema/Spikevax (0,25мл) или Vaxzevria (Astra Zeneca) (0,5 мл)	Comimaty Pfizer/BioNTech (0,3 мл) или Modema/Spikevax (0,25мл)
Janssen Johnson & Johnson	Comimaty Pfizer/BioNTech (0,3 мл) или Modema/Spikevax (0,25мл) или Janssen Johnson&Johnson (0,5 мл)	Comimaty Pfizer/BioNTech (0,3 мл) или Modema/Spikevax (0,25мл)
Gam- COVID-Vac (Sputnik V)	Comimaty Pfizer/BioNTech (0,3 мл) или Modema/Spikevax (0,25мл) или Janssen Johnson&Johnson (0,5 мл)	Comimaty Pfizer/BioNTech (0,3 мл) или Modema/Spikevax (0,25мл)
Corona Vac (Sinovac)	Comimaty Pfizer/BioNTech (0,3 мл) или Modema/Spikevax (0,25мл) или Janssen Johnson&Johnson (0,5 мл) или CoronaVac (Sinovac) (0,5 мл)	Comimaty Pfizer/BioNTech (0,3 мл) или Modema/Spikevax (0,25мл)
Sinopharm	Comimaty Pfizer/BioNTech (0,3 мл) или Modema/Spikevax (0,25мл) или Janssen Johnson&Johnson (0,5 мл) или Sinopharm (0,5 мл)	Comimaty Pfizer/BioNTech (0,3 мл) или Modema/Spikevax (0,25мл)

Приложение № 5 к Приказу
Министерства здравоохранения
Приднестровской Молдавской Республики
от 23 августа 2022 года № 729

Схема иммунизации второй бустерной профилактической прививкой против COVID-19
для лиц с тяжёлыми иммунодепрессивными состояниями в возрасте старше 18 лет

Название вакцины	1-ая бустерная доза профилактической прививки против COVID-19	2-ая бустерная доза профилактической прививки против COVID-19 вводится через 4 месяца после 1-ой бустерной дозы профилактической прививкой против COVID-19
Comirnaty Pfizer/ BioNTech	Comirnaty Pfizer/BioNTech (0,3 мл) или Modema/Spikevax (0,25мл)	Comirnaty Pfizer/BioNTech (0,3 мл) или Modema/Spikevax (0,25мл)
Moderna (Spikevax)	Comirnaty Pfizer/BioNTech (0,3 мл) или Modema/Spikevax (0,25мл)	Comirnaty Pfizer/BioNTech (0,3 мл) или Modema/Spikevax (0,25мл)

Vaxzevria (Astra Zeneca)	Comirnaty Pfizer/BioNTech (0,3 мл) или Moderna/Spikevax (0,25мл) или Vaxzevria (Astra Zeneca) (0,5 мл)	Comirnaty Pfizer/BioNTech (0,3 мл) или Moderna/Spikevax (0,25мл)
Janssen Johnson & Johnson	Comirnaty Pfizer/BioNTech (0,3 мл) или Moderna/Spikevax (0,25мл) или Janssen Johnson&Johnson (0,5мл)	Comirnaty Pfizer/BioNTech (0,3 мл) или Moderna/Spikevax (0,25мл)
Gam- COVID- Vac (SputnikV)	Comirnaty Pfizer/BioNTech (0,3 мл) или Moderna/Spikevax (0,25 мл) или Janssen Johnson&Johnson (0,5 мл)	Comirnaty Pfizer/BioNTech (0,3 мл) или Moderna/Spikevax (0,25мл)
CoronaVac (Sinovac)	Comirnaty Pfizer/BioNTech (0,3 мл) или Moderna/Spikevax (0,25мл) или Janssen Johnson&Johnson (0,5 мл) или CoronaVac (Sinovac) (0,5 мл)	Comirnaty Pfizer/BioNTech (0,3 мл) или Moderna/Spikevax (0,25мл)
Sinopharm	Comirnaty Pfizer/BioNTech (0,3 мл) или Moderna/Spikevax (0,25мл) или Janssen Johnson&Johnson (0,5 мл) или Sinopharm (0,5 мл)	Comirnaty Pfizer/BioNTech (0,3 мл) или Moderna/Spikevax (0,25мл)